

ODVZEMA KOŠČKA MIŠICE ZA MIKROSKOPSKI PREGLED

Odvzem koščka mišice je namenjen temu, da se na njem opravijo diagnostične svetlobno-mikroskopske in elektronsko-mikroskopske preiskave. Za poseg navadno izberemo zmerno prizadeto mišico. Kožo nad mišico očistimo ter vanjo in v mišico vbrizgamo lokalni anestetik. V kožo s skalpelom napravimo majhno zarezo dolgo približno 3 mm. Skoznjo v mišico vbodemo debelejšo iglo, ki ima na koncu drobne kleščice. Le-te v mišici razpremo in nato odščipnemo košček tkiva. To ponovimo dvakrat ali trikrat. Odvzeti koščki imajo premer približno 2 do 3 mm. Rano prelepimo z lepilnim trakom za celjenje ran in pokrijemo z obližem. Zaradi preprečevanje krvavitve v mišico ali pod kožo svetujemo počivanje po opravljenem posegu pod nadzorom medicinske sestre do pol ure hkrati s hlajenjem z ledom. Ud, kjer je bila biopsija opravljena, za 6 ur povijem s kompresijskim povojem. Zaradi prejetega anestetika naj biopsirana oseba na dan posega ne vozi avta. Bolečina, tudi ko delovanje anestetika popusti, ni velika in večina ne potrebuje protibolečinskih zdravil. Če pa že, priporočamo jemanje paracetamola (Lekadol). Teden dni naj se z obližem prekritega dela uda ne moči z vodo, da ne pride do vnetja. Po tednu dni se obliž odstrani.