

Zapleti pri nameščeni opornici

- Trakci, s katerimi je nameščena, popustijo.
- Opornica lahko zdrsne naprej.
- Poškodba kože.
- Pekoča bolečina.
- Zbadajoča bolečina v konici prstov.
- Mravljinčenje prsta.

Če se pojavi kateri od teh zapletov, je potrebno takoj poiskati zdravniško pomoč!

Specialistične travmatološke ambulante

Poliklinika – pritličje, hodnik A
Njegoševa cesta 4, Ljubljana

Ob delavnikih od 8.00 do 18.00 (potrebujete napotnico osebnega zdravnika).

☎ 01 522 24 27

Urgentni kirurški blok

Bohoričeva ulica 4, Ljubljana

Ob delavnikih od 18.00 do 8.00.

Ob sobotah, nedeljah in praznikih.

☎ 01 522 31 59

Vljudno Vas prosimo, da ta navodila upoštevate v celoti, ker edino tako lahko dosežemo želeni izid zdravljenja.

Na vaša morebitna vprašanja bomo radi odgovorili v naši mavčarni.

Mavčarna – Urgentni kirurški blok

☎ 01 522 31 59

Mavčarna – Poliklinika

☎ 01 522 24 27

Želimo vam čim hitrejšo in uspešno okrevanje!

univerzitetni
klinični center ljubljana 
University Medical Centre Ljubljana

Kirurška klinika
Klinični oddelek za travmatologijo
Zaloška cesta 7
T: 01 522 32 55

E: matej.cimerman@kclj.si
W: www.kclj.si

OPORNICA ZA MALLET FINGER

Zdravstveno vzgojne vsebine

Spoštovani!

Namestili smo Vam industrijsko opornico, narejeno iz plastike, ki smo jo prilepili ob prst z obližem. Namenjena je imobilizaciji in zdravljenju kite iztegovalke zadnjega členka prsta.

Z opornico približamo poškodovani del na narastišče, ga zadržimo v tem položaju in s tem omogočimo zaraščanje poškodovanega dela.

Opornico nosite toliko časa, kolikor je odredil zdravnik.

Odstranimo jo lahko le z njegovo privolitvijo.



V primeru, ko industrijsko izdelana opornica ni ustrezna, Vam namestimo opornico iz aluminija in mehke pene.

Med izvajanjem osebne higiene morate paziti, da opornice ne zmočite.

Lepilni trakovi lahko popustijo, opornica pa postane nefunkcionalna.

Poškoduje se lahko tudi koža.

