

NAVODILO PACIENTOM

RETROGRADNA PIELOGRAFIJA

Spoštovani!

Pripravljate se na preiskavo, ki jo izvajamo na Kliničnem inštitutu za radiologijo. Pojasnilo, ki je pred vami, vam opisuje preiskavo, ki je pri vas načrtovana, ter vam daje napotke za ravnanje pred in po njej. Prosimo vas, da si ga temeljito preberete in odgovorite na priloženi vprašalnik. Vašo preiskavo bo opravil tim zdravnikov in radioloških inženirjev.

PRIPRAVA NA POSEG

V cistoskopirnici vam preko cistoscopa vstavijo najprej v mehur, nato v sečevod do ledvice uretorni kateter, po katerem lahko nato apliciramo kontrastno sredstvo. Ponavadi vstavijo še urinski kateter, ob katerega fiksirajo ureternega.

Nato vas pripeljejo na radiološki oddelek na ležečem vozičku. Previdno vas preložimo na radiološko mizo in pazimo, da uretorni kateter ne izpade.

POTEK PREISKAVE

Retrogradna pielografija je kombinirana cistološko-radiološka preiskava, pri kateri prikažemo uropoetski trakt s kontrastnim sredstvom.

Na kateter pritrdimo brizgo s kontrastom in nastavek, ki se tesno prilega lumnu katetra. Zdravnik radiolog brizga kontrastno sredstvo v ledvico, nato se napolni še sečevod do vstopa v mehur.

V primeru, ko urolog naroči obojestransko retrogradno pielografijo, preiskavo leve in desne strani, izvajamo preiskavi ločeno. Kateter postopoma izvlečemo ob sočasnem brizganju kontrastnega sredstva ter slikamo.

Na koncu preiskave kateter odstranimo (razen izjemoma, če urolog naroči drugače), da prikažemo odtok kontrastnega sredstva.

MOŽNI ZAPLETI

- alergična reakcija na kontrastno sredstvo
- akutno vnetje sečil
- porast telesne temperature, mrzlica in bolečine, lahko tudi sepsa (zastrupitev)
- perforacija – poškodba sečil
- nastanek infekcije
- edem - oteklina stene sečevoda

RAVNANJE PO PREISKAVI

Po preiskavi se boste preoblekli v svoja oblačila. Če med preiskavo ali takoj po njej opazite neobičajne znake (srbečico, izpuščaje, praskanje v grlu, otekline obraza, občutek težkega dihanja) povejte to zdravstvenemu osebju, ki poseg opravlja. V primeru suma na poznejše zaplete npr. izrazitejšo bolečino se obrnete na lečečega ali osebnega zdravnika.