

NAVODILO PACIENTOM

URETROGRAFIJA

Spoštovani!

Pripravljate se na preiskavo, ki jo izvajamo na Kliničnem inštitutu za radiologijo. Pojasnilo, ki je pred vami, opisuje preiskavo, ki je pri vas načrtovana, ter vam daje napotke za ravnanje pred in po njej. Prosimo vas, da si ga temeljito preberete in odgovorite na priloženi vprašalnik. Preiskavo bo opravil tim zdravnikov in radioloških inženirjev.

OPIS PREISKAVE:

Sečnico rentgensko prikažemo ob retrogradni polnitvi s kontrastnim sredstvom (KS). S pomočjo posebnega nastavka, ki ga pritrdimo na zunanje ustje sečnice, brizgamo KS proti mehurju. Ko prikažemo celotno sečnico in napolnimo mehur, slikamo sečnico tudi med uriniranjem.

V primeru, da imate vstavljen v mehur urinski kateter, nas prosim obvestite na telefon 01/522 34-14.

MOŽNI ZAPLETI:

Pri preiskavi ne pričakujemo zapletov, možni pa so nekateri zelo redki zapleti:

- preobčutljivostna (alergična) reakcija na kontrastno sredstvo,
- pri direktnih polnitvah KS so možne poškodbe sečnice (krvavitve, ki se ponavadi sama zaustavi), osnovnega bolezenskega stanja sečil in morebitnih anatomskih posebnosti. V primeru večje krvavitve je potreben obisk lečečega zdravnika ali urologa, ki vam predpiše antibiotik.

RAVNANJE PO PREISKAVI:

Po preiskavi 20 minut počivajte.

Bodite pozorni na pojav srbečice, izpuščaja po koži, praskanja v grlu ali občutka težkega dihanja, nenadne otekline obraza ali zgornjega dela trupa. Če se pojavi kakšen od teh znakov, nas takoj opozorite. Če se podobni znaki pojavijo kasneje, že po odpustu iz naše ustanove, morate takoj poiskati pomoč lečečega ali osebnega zdravnika.